

Pomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii **APELUJE** do hodowców i właścicieli gospodarstw utrzymujących trzodę chlewną.

Szanowni Państwo!

ASF, czyli afrykański pomór świń - to wyjątkowo groźna, nieuleczalna, wysoce zakaźna i zaraźliwa, wirusowa choroba świń domowych oraz dzikich. ASF podlega obowiązkowi urzędowego zwalczania. **ASF nie jest groźny dla człowieka**, ale region w którym zostanie stwierdzona choroba narażony jest na **poważne straty ekonomiczne** (ograniczenia w handlu i obrocie szwinią i wieprzowiną).

Źródłem zakażenia ASF mogą być świnię domowe, świnię dzikie, ale również **mięso pochodzące od zakażonych świń, dzików** oraz zakażone **produkty wyprodukowane z mięsa chorych świń i dzików**.

W związku z pojawianiem się ognisk choroby u świń oraz przypadków afrykańskiego pomoru świń u dzików na terenie sąsiedniego województwa warmińsko-mazurskiego zwracam się z prośbą o bezwzględne przestrzeganie zasad bioasekuracji:

- utrzymywanie świń **wykluczające kontakt ze zwierzętami wolno żyjącymi i domowymi** po przez odpowiednie zabezpieczenie budynków **oraz odseparowanie od innych kopytnych w gospodarstwie**, po przez utrzymywanie świń w osobnych pomieszczeniach z osobnym wejściem do budynku;
- stosowanie **pasz i ściółki w sposób wykluczający kontakt z dzikami** i zabezpieczonymi przed dostępem zwierząt wolno żyjących i domowych;
- **wyłożenie mat dezynfekcyjnych** stale nasączonych środkami dezynfekcyjnym o wymiarach wskazanych w przepisach, w wejściach i wyjściach do pomieszczeń, w których utrzymywane są świnię;
- **stosowanie odzieży i obuwia przeznaczonych tylko do obsługi świń** przez osoby wyłącznie wykonujące te czynności, które zmienia się i nakłada każdorazowo wchodząc do budynku;
- zachowanie **higieny i dezynfekcji obuwia i rąk** każdorazowo wchodząc do pomieszczeń, a także systematyczna dezynfekcja sprzętu i narzędzi w gospodarstwie;
- **prowadzenie rejestrów** wejść i wyjść osób z zewnątrz, wjazdu i wyjazdu samochodów do przewozu świń i paszy lub produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, oraz prowadzenie i aktualizowanie **spisu świń** z podziałem na grupy produkcyjne w gospodarstwie;
- nie kupowanie świń nieoznakowanych, nie zgłoszonych do rejestru, bez świadectw zdrowia świń, które mogły pochodzić z niewiadomego pochodzenia;
- nie wnoszenia na teren gospodarstwa produktów od dzików, co do których jest najmniejsze podejrzenie skażenia ASF, a po polowaniu zachowanie min. 72 godzin przed wejściem do pomieszczeń, w których utrzymywane są świnię.

Wybierając środek do dezynfekcji należy zwrócić uwagę na:

1. **Spektrum działania** na drobnoustroje: produkt powinien **wykazywać działanie wirusobójcze**;
 2. **Zakres temperatur** – środek dezynfekcyjny powinien być skuteczny zarówno w wysokiej, jak i niskiej temperaturze w budynku;
 3. **Bezpieczeństwo działania** środka dezynfekującego: produkt powinien być biodegradowalny, nie wymagający spłukiwania, nie powinien korodować z elementami wyposażenia;
 4. **Zakres stosowania**: produkt powinien służyć do dezynfekcji budynków, wyposażenia, ziemi wokół budynku, samochodów, obuwia, mat dezynfekcyjnych i basenów przejazdowych.
 5. **Dezynfekcję obiektów** inwentarskich należy przeprowadzać w systemie pomieszczeń pustelne oraz dbać o codzienne rutynowe działania jak dezynfekcja rąk, obuwia, pojazdów itd.
- Produkty biobójcze należy stosować ściśle według wskazań producenta.**

Więcej informacji na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Weterynarii

<https://www.wetgiw.gov.pl/>

lub bezpośrednio **w powiatowych inspektoratach weterynarii**

Pomorska Inspekcja Weterynaryjna

<http://www.gdansk.wiw.gov.pl/>